

# VÆVSPRØVE FRA LIVMODERHULEN

## HVAD ER EN VÆVSPRØVE FRA LIVMODERHULEN?

En vævsprøve fra livmoderhulen, også kaldet vabrasio eller en pipelle prøve, er en kortvarig udsugning ved vacuum. Indgrebet kan foregå i lokalbedøvelse, og de fleste vil kun mærke et let ubehag eller slet intet.

## HVORFOR LAVER MAN EN VÆVSPRØVE FRA LIVMODERHULEN?

Det sker, at menstruationen skifter karakter, styrke og varighed, især når man er over 40 år. Det kan også være, at man pletbløder mellem menstruationerne eller har pletblødninger ved samleje. Dette skyldes oftest hormonforstyrrelser eller godartede lidelser som fx en polyp på livmoderhalsen eller inde i livmoderen.

For kvinder, der endnu ikke er gået i overgangsalderen, er det meget sjældent, at blødningsforstyrrelser skyldes noget ondartet.

Ældre kvinder, som begynder at bløde igen efter overgangsalderen, også kaldet postmenopausal blødning, bør som regel have foretaget vævsprøve fra livmoderhulen.

## HVORDAN FOREGÅR EN VÆVSPRØVE FRA LIVMODERHULEN?

Lægen foretager først en gynækologisk undersøgelse og en ultralydsscanning. Herefter indføres et tyndt plasticrør i livmoderhulen og en mindre prøve fra slimhinden løsnes fra livmoderhulen og suges ud. Det er sjældent nødvendigt med lokalbedøvelse af livmoderhalsen, men kan hos nogle være en god ide.

Prøven sendes til mikroskopisk undersøgelse hos en patolog. Lægen får besked om årsagen til blødningsforstyrrelsen efter ca. 3 uger.

## ER MAN SYGEMELDT EFTER EN VÆVSPRØVE?

Nej. Efter en vævsprøve kan du måske tage fri resten af dagen, men du er hurtigt frisk igen. Det er normalt, at man pletbløder i dagene efter vævsprøven. Hvis man derimod begynder at bløde meget, eller får smerter eller feber, skal man kontakte sin gynækolog, egen læge eller vagtlægen.



LÆS MERE PÅ  
[www.netdoktor.dk](http://www.netdoktor.dk)