

FRYSEBEHANDLING

FORMÅL

Ved frysebehandling fjernes det øverste lag af slimhinden på livmoderhalsen, som er kronisk betændt, således at nyt sundt væv kan vokse frem.

SÅDAN FOREGÅR FRYSEBEHANDLINGEN

Der lægges lidt lokalbedøvelse i din livmoderhals. Derefter fryses der på din livmoderhals ved hjælp af en fryserspray i 6 sekunder. Behandlingen gentages efter en kort pause, i alt 6 gange. Den kan give en kuldefølelse og hos nogle en let menstruationslignende smerte. Behandlingen gentages normalt efter en til to uger, evt. tilbydes flere behandlinger.

EFTER BEHANDLINGEN

Der kan være rigeligt vandigt eller blodigt udflåd i nogle uger efter behandlingen, hvilket som regel kan klares med trusseindlæg eller bind. Enkelte vil bløde kraftigere lige efter frysebehandlingen, men det aftager i løbet af et døgn.

FORHOLDSREGLER FØR FRYSEBEHANDLINGEN

Behandlingen skal helst foregå lige efter din menstruation er stoppet. Falder det sammen, bedes du kontakte klinikken og få en ny tid.

For at mindske ubehag og eventuelle smerter kan du med fordel tage 2 tbl. Paracetamol á 500 mg og 2 tbl. Ibuprofen á 200 mg 1 time før behandlingen.

FORHOLDSREGLER EFTER FRYSEBEHANDLINGEN

Så længe der er vandigt eller blodigt udflåd, bør du undlade at bruge tampon, gå i karbad og svømmehal. Du tilrådes desuden at bruge kondom ved samleje i denne periode.

