


# KIKKERTUNDERSØGELSE AF LIVMODERHULEN



Din livmoderhule skal kikkertundersøges. Undersøgelsen foretages ofte, hvis man har mistanke om en polyp, du har blødnings- eller graviditetsproblemer.

## HER KAN DU LÆSE MERE OM UNDERSØGELSEN, OG HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

Undersøgelsen foregår ved, at gynækologen fører et lille kikkertinstrument gennem skeden op i livmoderhulen. For at få et godt billede gennem kikkerten bliver livmoderhulen skyllet med saltvand. Gennem kikkerten får man et billede af livmoderhulens slimhinde samt afgang af æggeledeerne, og hvis der findes en polyp, en muskelknude eller eventuelt en skillevæg i livmoderen, kan denne evt. fjernes ved hjælp af kikkerten. I nogle tilfælde vil dette dog kræve, at der aftales en ny tid for indgrebet. Undersøgelsen tager 15-30 minutter, foregår uden bedøvelse og er normalt uden større ubehag.

## FØR DU KOMMER TIL UNDERSØGELSEN:

Hvis undersøgelsen skal foretages, fordi du har svært ved at blive gravid, er det vigtigt, at du ikke har menstruation. Hvis du har menstruation omkring undersøgelsesdagen, skal du ringe til os hurtigst muligt og aftale en ny tid.

Du bør tage forebyggende smertestillende (Paracetamol 1000 mg og Ibuprofen 400 mg) 1 time inden undersøgelsen. Livmoderen trækker sig nemlig enkelte gange sammen som ved menstruation, når der skal opereres inde i livmoderhulen, hvilket for nogen kan være smerteudløsende.

Hvis undersøgelsen skal foretages, fordi du har blødningsproblemer, kan den gennemføres, selv om du bløder – blot det ikke er for kraftigt. Undersøgelsen kan ikke laves, hvis du er gravid. Derfor er det vigtigt, at du bruger sikker prævention fra første menstruationsdag og frem til undersøgelsesdagen.

## EFTER UNDERSØGELSEN

Du kan have en smule blødning og lette mavesmerter efter undersøgelsen – det er helt normalt. For dette kan du tage smertestillende medicin i form af 1000 mg paracetamol og 400 mg ibuprofen hver 6.-8. time det første døgn.

## NÅR DU ER KOMMET HJEM

Du kan forvente let blødning i nogle dage efter undersøgelsen afhængigt af, hvad der er foretaget. Kontakt klinikken eller din egen læge, hvis du får feber, stærke smerter eller meget kraftig blødning.

## SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Efter ca. 2-3 uger får du svar fra klinikken på undersøgelsen af det væv der er fjernet.